

Empfohlene Mindestwerte für Rückenmarksnahe Anästhesie:
INR \leq 1,4 / Thrombozyten $>$ 100'000
In medizinisch begründeten Fällen darf von diesen Grenzen abgewichen werden

Wirkstoff	Markenname		vor Punktion/ Katheterentfernung	nach Punktion/ Katheter- entfernung	vor Chirurgie															
UFH prophylaktisch		DGAI	4h	1h																
UFH therapeutisch		DGAI	iv:4h sc:8h	1h																
LMWH prophylaktisch (Clexane, Fragmin, Fraxiparin)		DGAI	12h	4h																
LMWH therapeutisch		DGAI	24h	4h																
Fondaparinux	Arixtra	SGAR	36h, bei CrCl $<$ 30 ml/min kontraindiziert	12h																
Danaparoid	Orgaran	DGAI	48h	3d																
Argatroban	Agatra	DGAI	4h	6h																
Dabigatran	Pradaxa	SGAR	36h	6h	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Blutungs- risiko</th> <th colspan="3">CreaCl (ml/min)</th> </tr> <tr> <th>$>$80</th> <th>50- 80</th> <th>$<$50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>niedrig</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>hoch</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> (in Tagen)	Blutungs- risiko	CreaCl (ml/min)			$>$ 80	50- 80	$<$ 50	niedrig	1	2	3	hoch	2	3	4
Blutungs- risiko	CreaCl (ml/min)																			
	$>$ 80	50- 80	$<$ 50																	
niedrig	1	2	3																	
hoch	2	3	4																	
Rivaroxaban	Xarelto	SGAR	1x10 mg: 24h $>$ 1x10 mg: 48h	6h	abh. von Blutungsrisiko klein:24h gross:48h															
Apixaban	Eliquis	SGAR	2x2.5 mg: 36h 2x5 mg: 72h	6h	abh. von Blutungsrisiko klein:24h gross:48h															
ASS 100mg		DGAI	ohne Einschränkung																	
ASS $>$ 100mg			7d-10d																	
ASS 100mg + LMWH prophylaktisch		DGAI	ASS weiter, LMWH 36h vorher pausieren																	
Bei Risikopatienten (ASS+LMWH prophylaktisch) kann 24h nach letzter LMWH-Gabe mit 1xUFH sc gebirgdt werden. ASS 100mg + (LMWH prophylaktisch <i>pausiert</i>) + UFH sc prophylaktisch			ASS weiter 4h vorher pausieren + PTT																	

ASS 100mg + LMWH therapeutisch		DGAI	ASS weiter, LMWH 48h vorher pausieren		
ASS 100mg + NSAID		DGAI	ASS weiter, NSAID Pause 4-5 HWZ, zB: Kettesse, Diclofenac, Ibuprofen: 12h		
Clopidogrel	Plavix	DGAI	7d	sofort	
Prasugrel	Effient	DGAI	7d	6h	
Ticagrelor	Brilique	SGAR	5d	6h	
Edoxaban	Lixiana	DGAI	1x30 mg: 24h >1x30 mg: 48h		24h